

رقم الوثيقة	RB.FR.108	تاريخ أول نشر	07.12.2016	تاريخ التنقيح	رقم التنقيح	رقم الصفحة	4 / 1
-------------	-----------	---------------	------------	---------------	-------------	------------	-------

سبب التنقيح :

بيانات المريض :

الإسم الكامل :

تاريخ الميلاد :

تاريخ القبول في المستشفى :

تاريخ المبيت في المستشفى :

رقم البروتوكول :

رقم الهاتف :

العنوان :

الحاجة إلى مترجم

هل هناك حاجة لمترجم ؟ نعم () لا ()

إذا كانت هناك حاجة لمترجم هل كان هناك مترجم متواجد أثناء الحصول على موافقتك ؟ نعم () لا ()

() مفتوح () بالمنظار (مغلق)

() الطرف الأيمن () الطرف الأيسر

() هرني مباشر () هرني غير مباشر

() هرني الفخذ وغيره

1. ما هي عملية الفتق الإربي ؟

هي عملية تعديل بطريقة جراحية لكيس غشاء البطن المتواجد بداخل الإعضاء أو خارجها والذي يكون خارجاً من جدار البطن الضعيف في منطقة الفخذ.

2. ما هي طريقة عملية الفتق الإربي ؟

في العملية الجراحية المفتوحة يتم فتح جرح في الجلد والعتور على الفتق ودفعه إلى داخل البطن وترقيع المنطقة بتقنيات جراحية أو غير جراحية وتقوية منطقة الفتق !

• أما الطريقة التنظيرية فهي تتم من خلال فتح ثقب صغير في جدار البطن والدخول باستخدام آلات خاصة إلى منطقة الفتق وتعديل المنطقة من خلال الترقيع أو عدم الترقيع.

3. مخاطر العمل الذي سيتم :

(1) مخاطر التخدير الموضعي : قد تظهر حساسية بسبب المواد المستخدمة مما قد يشكل خطراً على حياة المريض إلا أن احتمالية ظهور حساسية نادر جداً.

(2) مخاطر التخدير العام : في الإستمارة الخاصة بالتخدير تم ذكر جميع مخاطره وإذا كان لديك أي قلق بخصوص التخدير قم بالتواصل مع إخصائي التخدير وإذا لم يتم تقديم إستمارة التخدير لك يرجى طلبها.

رقم الوثيقة	RB.FR.108	تاريخ أول نشر	07.12.2016	تاريخ التنقيح	رقم التنقيح	رقم الصفحة	4 / 2
-------------	-----------	---------------	------------	---------------	-------------	------------	-------

3. المخاطر العامة للعملية : المخاطر الموضحة أدناه هي مخاطر عامة ونسبة تحققها في هذه العملية البسيطة ضئيل جداً :
* خطوة الإصابة في عدوى بالرئة وحدوث إنطفاء في بعض المناطق الصغيرة في الرئة. في هذه الحالة يتم استخدام المضاد الحيوي والعلاج الطبيعي.

- * مع الألم والانتفاخ قد يتخثر الدم في الشرايين وفي حالات نادرة قد ينتقل التخثر من مكانه الرئة ويتسبب في الوفاة.
- * بسبب الضغط على القلب قد ينتج عن ذلك أزمة قلبية أو شلل أو وفاة.
- * لدى المرضى الذين يعانون من السمعة تزداد خطورة ظهور عدوى في مكان الجرح أو عدوى في الرئة أو مضاعفات أو تخثر.
- * عدوى المستشفى : ذات الرئة ، التهاب في غشاء المخ ، عدوى في المسالك البولية ، عدوى في الجسم بسبب إنتقال الجراثيم إلى الدم.
- * قد يعاني المريض بعد العملية من حالة من القلق أو الصدمة النفسية.
- * المرضى المدخنون تزداد لديهم احتمالية العدوى في الجرح والرئة ومضاعفات في القلب والرئة وتخثر الدم.

4. مخاطر ومضاعفات عملية الفتق الإربي : تم أدناه توضيح المخاطر والمضاعفات المتوقعة بسبب هذه العملية.
* قد يحدث نزيف أثناء العملية ويستوجب نقل دم إلى المريض وهي أمور لها مضاعفات خاصة بها وقد تتسبب بالوفاة.
* الألات التي سيتم استخدامها أثناء العملية قد تظهر بها مشاكل تقنية مما يتسبب بمضاعفات كالحروق.
* بعد العملية قد تظهر إلتهابات في داخل البطن والرئة والجهاز التنفسي والمسالك البولية والجرح وعندها قد تظهر الحاجة إلى إجراء عملية أو تدخلات جراحية بسيطة.

- * إذا كان المريض ذكراً قد تحدث جروح في شرايين الخصيات وقناة الحيوانات المنوية وفي أسوأ الحالات قد يقضي تماماً على الخصيات أو يكون هناك إضطراب لإستئصالها. قد تحدث أيضاً إصابات في داخل البطن أو الأمعاء أو المثانة وتكون هناك حاجة إلى التدخل.
- * قد تكون هناك حاجة إلى ربط الأمعاء بكيس خارجي بسبب المضاعفات التي قد تظهر أثناء العملية.
- * بعد العملية قد يكون هناك تخدر أو نمنمة أو فقدان حس في منطقة الفخذ ومكان العملية والأجزاء الداخلية من السيقان.
- * من الممكن في عملية تعديل الفتق استخدام رقعة إصطناعية ولكونها مادة غريبة عن الجسم فقد تكون هناك ردات فعل تتسبب بالإلتهاب. في هذه الحالة قد تكون هناك حاجة لتكرار العملية وإخراج الرقعة وبفي بعض الحالات تظهر خطورة تكرار الفتق أو تسبب الرقعة بعد فترة طويلة بإصابة أو ثقب في الأمعاء أو الناسور.

- * أثناء العملية قد يحدث نزيف وبعد العملية قد تلتهب المنطقة أو يتجمع بها سائل أصفر. من الممكن تفريغ السائل من خلال حقنة أو فتح المنطقة وتفريغها مما قد يتسبب بجرح وبطيل مدة التحسن وأحياناً قد تكون هناك حاجة لتكرار العملية.
- * لدى بعض المرضى قد تكن منطقة العملية بلون أحمر أو بنفسجي.
- * في بعض الأحيان قد يموت الجلد في منطقة العملية أو قد يتشوه ومن الممكن تخطي ذلك من خلال العلاج أو عملية إضافية أو نقل جلد.
- * قد يتكرر الفتق مع مرور الزمن وذلك بسبب بنية المريض أو قيامه برفع أثقال أو فقدان الوزن أو الكحة أو الإمساك وطريقة حياة المريض.
- * إذا قرر الطبيب بأن العملية ستكون صعبة أو أن الإستمرار بالعملية قد يؤثر عليك فمن الممكن أن يقوم بتوقيف العملية ونقلك إلى مستشفى آخر.

* عند اللزوم قد يقوم الطبيب أثناء العملية بمناداة الأطباء الإخصائيين في المجالات الأخرى للقيام بالتدخل اللازم. لإذا لاحظ الطبيب أثناء العملية جود حالات مرضية أخرى فقد يتدخل ويتخذ القرار اللازم أثناء العملية.



إستمارة الموافقة على الفتق الإربي



رقم الوثيقة	RB.FR.108	تاريخ أول نشر	07.12.2016	تاريخ التنقيح		رقم التنقيح		رقم الصفحة	4 / 4
-------------	-----------	---------------	------------	---------------	--	-------------	--	------------	-------

إسم المريض :
التوقيع :
التاريخ :
الساعة :

إسم قريب المريض :
التوقيع :
التاريخ :
الساعة :

إسم الطبيب :
التوقيع :
التاريخ :
الساعة :